



## Araukany – AR

Skupina: G2

*S – Araucany, N – Araucana, F – Araucana, A – Araucana*

Původ:	Chile
Charakteristika:	Původní jihoamerické plemeno s řadou specifických znaků. Vyznačuje se živým temperamentem a poměrně rychlým růstem. Barva kůže je žlutá. Dle některých literárních údajů obsahují vejce araukan v porovnání s jinými plemeny méně cholesterolu. Snáška je 160 - 180 vajec s modrozelenou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 50 g. <b>VV: jiná barva skořápky</b>
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 1,9 - 2,2 min. 1,6 max. 2,7 slepice 1,5 - 1,8 min. 1,2 max. 2,3 nad 1 rok: kohout 2,1 - 2,5 min. 1,8 max. 3,0 slepice 1,7 - 2,1 min. 1,4 max. 2,6
Kroužek:	kohout 18 mm, slepice 16 mm
1. Plemenný typ:	Bezocasá slepice specifického typu, menšího tělesného rámce, s lehce zvednutým, válcovitým trupem, středně vysokého postoje. Podle výskytu pernatých ozdob se plemeno dělí do tří skupin - na rázy <b>pouze s příušními licousy</b> , rázy <b>pouze s vousem</b> a rázy <b>s příušními licousy a podbradním vousem</b> .

<b>Plemenné znaky kohouta:</b>	
2. Hlava:	širší, klenutá <i>VV: úzká, plochá</i>
– zobák:	silný, lehce zahnutý; v závislosti na zbarvení peří žlutý, světle rohový až tmavě rohový
– hřeben:	hráškový, třířadý, pevný, někdy méně pravidelný; červený, u tmavých rázů může být i začernalý <i>VV: abnormálně velký a hrubý, s náznakem klopení, ořechový, listový</i>
– obličej:	červený, u tmavých rázů může být i začernalý
– ušnice:	červené; menší; u rázů s postranními vousy barva bez významu
– laloky:	velmi malé, jemné; u rázů s podbradním vousem zcela zakrnělé, kryté vousem <i>VV: dlouhé, hrubé; u rázů s podbradním vousem viditelné, nezakryté vousem</i>
– licousy:	základ licousů tvoří „bradavky“ v oblasti příušší; licousy jsou tvořeny větším počtem užších a delších per, která vyrůstají do strany a mírně vzhůru, jejich ostny se ohýbají nazad a rozvírají se do tvaru užšího štětce <i>VV: jednostranně vyvinuté, řídké, krátké, svěšené</i>
– vous:	zakrývá ušnice i laloky, rozdělený na postranní vousy a kratší podbradní vous; u rázů s licousy a vousem nejsou postranní vousy vyvinuté, ale je vyvinut jen podbradní vous <i>VV: dlouhý roubikovitý podbradní vous, málo vyvinutý, řídký</i>
– oči:	výrazné; v závislosti na zbarvení peří oranžově červené, červené až červenohnědé
3. Trup:	středně dlouhý, válcovitý, zaoblený, dobře osvalený, jen lehce zvednutý <i>VV: hranatý, úzký, špičatý, <b>vodorovně nesený</b>, velmi vysoko zvednutý</i>
– záda:	delší, v ramenu širší, dozadu poněkud spadající, táhlým plynulým obloukem přecházející do oblasti zádi, s bohatě opeřeným sedlem <i>VV: krátká, <b>vodorovně nesená</b></i>
– prsa:	široká, dobře klenutá, mírně zvednutá <i>VV: plochá</i>
– břicho:	dobře vyvinuté
4. Krk:	středně dlouhý, s bohatým krčním závěsem spadajícím až na ramena a plynule přecházejícím do linie zad
Křídla:	středně dlouhá, v ose trupu nesená, nepřesahující délku trupu, těsně přilehlá <i>VV: přesahující délku trupu</i>

Ocas:	zcela chybí; zadní partie hladce uzavřena peřím sedlového závěsu <i>VV: vyvinutý ocas</i>
Nohy:	postoj středně vysoký, širší
- holeně:	středně dlouhé, mírně vystupující, dobře opeřené
- běháky:	středně dlouhé; v závislosti na zbarvení peří vrbově zelené, olivově černé, nebo žluté černě skvrnitě, u všech odstínů se žlutavými chodidly <i>VV: chybějící žlutavé zbarvení chodidel</i>
5. Opeření:	bohatší, dobře přilehlé, bez podušek <i>VV: řídké peří</i>
<b>Plemenné znaky slepice:</b>	V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší, trup má vodorovně nesený, plnější, širší a hlubší a břicho prostornější. Hřeben a laloky má oproti kohoutovi zřetelně menší. <i>VV: vysoko zvednutý trup</i>
5. Barevné rázy:	<p>č. K 242 - Bílé - oči oranžově červené; zobák světle žlutý až světle rohový; běháky žlutozelené až vrbově zelené</p> <p>č. K 238 - Černé - oči červené až červenohnědé; zobák tmavě rohový; běháky olivově černé</p> <p>č. K 239 - Modré - oči červené až červenohnědé; zobák tmavě rohový; běháky olivově černé</p> <p>č. K 240 - Modré s lemy - oči červené až červenohnědé; zobák tmavě rohový; běháky olivově černé</p> <p>č. K 001 - Divoké - oči oranžově červené; zobák tmavě rohový; běháky vrbově zelené</p> <p>č. K 019 - Zlatokrké - oči oranžově červené; zobák rohový; běháky vrbově zelené</p> <p>č. K 020 - Stříbrokrké - oči oranžově červené; zobák rohový; běháky vrbově zelené</p> <p>č. K 004 - Modré divoké - oči oranžově červené; zobák tmavě rohový; běháky vrbově zelené</p> <p>č. K 022 - Modré zlatokrké - oči oranžově červené; zobák rohový; běháky vrbově zelené</p> <p>č. K 099 - Černé červenokrké - oči červené až červenohnědé; zobák tmavě rohový; běháky olivově černé</p> <p>č. K 103 - Modré červenokrké - oči červené až červenohnědé; zobák tmavě rohový; běháky olivově černé</p> <p>č. K 084 - Zlaté pšeničné - oči oranžově červené; zobák světle rohový; běháky světle vrbově zelené</p> <p>č. K 086 - Modré zlaté pšeničné - oči oranžově červené; zobák světle rohový; běháky světle vrbově zelené</p> <p>č. K 231 - Krahujcovité - oči oranžově červené; zobák světle žlutý až rohový; běháky žluté s černými skvrnami</p>

Původ:	Německo, USA
Charakteristika:	Zdrobnělá forma velkého plemene. Údaje o snášce chybí. Vejce s modrozelenou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 25 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 0,8 - 1,0 min. 0,6 max. 1,2 slepice 0,6 - 0,8 min. 0,4 max. 1,0 nad 1 rok: kohout 0,9 - 1,2 min. 0,7 max. 1,4 slepice 0,7 - 1,0 min. 0,5 max. 1,2
Kroužek:	kohout 13 mm, slepice 11 mm

Pavel a Tulaček (2006)