



## Holokrčky – HK

Skupina: G2

*S – Holokrčky, N – Nackthalshühner, F – Cou-nu,  
A – Transylvanian Naked Neck*

Původ:	Rumunsko
Charakteristika:	Původní krajové plemeno, později zušlechtěné především v Německu na produkci vajec i masa. V současnosti se chová především jako plemeno okrasné. Vyznačuje se živým temperamentem, rychlým růstem, velmi dobrou zmasilostí a chutným masem. Barva kůže na opeřených částech těla je bílá. Snáška je 150 - 180 vajec s krémovou až téměř bílou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 55 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 2,4 - 2,9 min. 2,1 max. 3,4 slepice 1,9 - 2,4 min. 1,6 max. 2,9 nad 1 rok: kohout 2,7 - 3,4 min. 2,3 max. 3,9 slepice 2,2 - 2,9 min. 1,8 max. 3,4
Kroužek:	kohout 20 mm, slepice 18 mm
1. Plemenný typ:	Slepice lehkého typu, středního až většího tělesného rámce, s válcovitým trupem, s poměrně dlouhým nízko neseným ocasem, středně vysokého postoje. Hlavním znakem plemene je neopeřený, červeně zbarvený krk. Opeření je poměrně řídké a s většími plochami tělních nažin než u většiny ostatních plemen. Většinou se chovají rázy s <b>listovým</b> hřebenem, méně často rázy s hřebenem <b>růžicovým</b> .

<b>Plemenné znaky kohouta:</b>	
2. Hlava:	středně velká, její výška je shodná s výškou hřebene a délkou laloků; s výjimkou temene neopeřená s červeně zbarvenou kůží; na temeni a v horní části týlu je malá, ostře ohraničená oblast opeření nazývaná „čepička“ <i>VV: hrubá, větší rozsah opeření</i>
– zobák:	poměrně silný, lehce zahnutý, barva v závislosti na zbarvení peří
– hřeben:	<b>listový:</b> středně velký, poněkud předsazený nad zobák, s lehce odstávajícím praporekem <i>VV: velký, hrubý, praporek přilehlý k týlu</i> <b>růžicový:</b> středně velký, pevně přisedlý, jemně perlený, s nepříliš dlouhým trnem sledujícím linii týlu, aniž by však k němu přiléhal <i>VV: velký, hrubě perlený, dlouhý a výrazně odstávající trn</i>
– obličej:	červený, hladký
– ušnice:	červené, jemné, poněkud odstávající, mírně svrstělé <i>VV: hrubé</i>
– laloky:	středně velké, kulaté <i>VV: dlouhé, kornoutovité</i>
– oči:	oranžově červené, u černých a modrých tmavě červené
3. Trup:	válcovitý, protáhlý, při pohledu z boku obdélníkového tvaru, jen mírně zvednutý; výrazně zmasilý <i>VV: trojúhelníkový, krátký, vysoko nesený; málo zmasilý</i>
– záda:	docela dlouhá, dozadu mírně zúžená, rovná, nazad nepatrně skloněná, s nepříliš dlouhým sedlovým závěsem a plynulým přechodem do linie nízko neseného ocasu <i>VV: krátká, úzká, výrazně nazad spadající, zřetelný zlom v místě přechodu do linie ocasu</i>
– prsa:	plná, dobře klenutá, ale nepříliš hluboká; v dolní části zcela zakrytá peřím vyrůstajícím ze dvou pruhů pernic, v horní části (vole) neopeřená s červeně zbarvenou kůží, přechod neopeřené a opeřené části pravidelně ostře ohraničený <i>VV: plochá; nepravidelně ohraničený přechod neopeřené a opeřené části, zakončení opeření ve tvaru „věnce“</i>
– břicho:	široké, dobře vyvinuté, nepříliš hluboké
4. Krk:	středně dlouhý, lehce esovitě prohnutý, zcela neopeřený; červené barvy <i>VV: bledý</i>
Křídla:	středně dlouhá, nepřesahující délku trupu, nesená rovnoběžně s linií zad, těsně přilehlá

Ocas:	středně dlouhý, široce nasazený pod úhlem asi 20 - 30°, plynule vycházející z linie sedla, téměř sevřený, rejdrováky převážně zakryty středně dlouhými srpy a bohatým, ale nepřilíš dlouhým ocasním krytem <i>VV: krátký, kulovitý, nebo dlouhý, s dlouhými srpy, výrazně rozevřený, úzce nasazený, vysoko nesený</i>
Nohy:	postoj středně vysoký <i>VV: velmi vysoký nebo velmi nízký postoj</i>
- holeně:	středně dlouhé, zřetelně vystupující, dobře zmasilé, s přilehlým opeřením, na vnitřní straně nažiny přibližně trojúhelníkového tvaru
- běháky:	středně dlouhé, jemnější; barva v závislosti na zbarvení peří
5. Opeření:	dobře přilehlé, oproti běžným plemenům jsou zvětšené plochy tělních nažin
<b>Plemenné znaky slepice:</b>	V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší, trup má plnější, vodorovně nesený a břicho prostornější. Záda má dlouhá, široká, rovná. Ocas má středně dlouhý, široce nasazený pod úhlem přibližně 20°, téměř sevřené rejdrováky zřetelně vyčnívají z peří ocasního krytu. Červené zbarvení hlavy a holého krku je většinou bledší než u kohouta. <i>VV: krátký trup, krátká záda, krátký nebo dlouhý ocas, vysoko nesený ocas, vějířovitě rozevřený ocas</i>
5. Barevné rázy:	č. K 242 - Bílé - zobák masový; běháky masové č. K 238 - Černé - zobák černý až tmavě rohový; běháky černé až břidlicové č. K 240 - Modré s lemy - zobák tmavě rohový; běháky břidlicové č. K 214 - Žluté - zobák světle rohový; běháky masové č. K 213 - Červené - zobák rohový; běháky masové, tmavší odstín přípustný č. K 216 - Černé bíle skvrnitě - zobák rohový; běháky masové s tmavými skvrnami č. K 010 - Koroptví - zobák rohový; běháky masové č. K 201 - Stříbrně černě vločkované - zobák rohový; běháky modrošedé č. K 197 - Pestré - zobák rohový; běháky masové č. K 231 - Krahujcovité - zobák rohový; běháky masové, tmavší skvrny jsou přípustné

Původ:	Německo
Charakteristika:	Zdrobnělá forma velkého plemene. Snáška asi 100 vajec s bílou až krémově zbarvenou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 30 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 0,8 - 1,0 min. 0,6 max. 1,2 slepice 0,6 - 0,8 min. 0,4 max. 1,0 nad 1 rok: kohout 0,9 - 1,2 min. 0,7 max. 1,4 slepice 0,7 - 1,0 min. 0,5 max. 1,2
Kroužek:	kohout 13 mm, slepice 11 mm

Pavel a Tuláček (2006)