



Názvy dle ES: N – Luchstaube, F – Lynx de Pologne, A – Polish Lynx.
 Zařazení v seznamu plemen ES: holubi tvaru č. 24.
 Původ: Západní Halič

Plemenné znaky

Poměrně krátký, nízko postavený silnější holub široké hrudi.

Posuzování

Celkový dojem – tvar těla – barva – šupkatost – pruhy.

Exteriér

- Hlava:** hladká, středně velká, se stoupajícím čelem, protáhle klenutá.
Oči: oranžové, až červené. **Obočnice** jemné, úzké, hladké, u modrých modrošedé, u černých tmavé, u červených a žlutých masově zbarvené.
Zobák: střední, u černých a modrých tmavý, u červených a žlutých voskový, čistý. **Ozobí** jemné.

Rys

- Křídla:** krátká, široká, přilehlá, dobře kryjí záda. Ohbí křídel kryté opeřením hrudi.
- Ocas:** krátký, široce nasazený, jen mírně spadající, téměř až vodorovně nesený.
- Opeření:** dobře vyvinuté, hladké, nepříliš přilehlé.
- Nohy:** krátké, neopeřené, bérce sotva znatelné. Barva drápků bez důležitosti.
- Krk:** krátký, silný, s poněkud nafouklým voletem. Hrdlo dobře vykrojené.
- Postava:** hrud' široká, plná a hluboká, záda krátká a široká, mírně spadající. Hmotnost nejméně 700g.

Barva a kresba

- a) modří; čistá základní barva s dlouhými, stejnoměrnými, protaženými pruhy černě lemovanými, s mírným zeleným leskem na krku.
- b) modří šupkatí; čistá základní barva, čistá stejnoměrná šupkatost s černým lemováním,
- c) černí; hluboká čern se zeleným leskem, s dlouhými lehce protaženými pruhy.
- d) černí šupkatí; hluboce černá barva se zeleným leskem, stejnoměrná šupkatost.
- e) červení a žlutí; sytá základní barva s protaženými stejnoměrnými pruhy.
- f) červení a žlutí šupkatí; sytá základní barva, stejnoměrná šupkatost. Šupkatost je pravidelná, jdoucí přes štíty křídel a ramena a je stejnoměrně rozdělena. Každé pírko má v horní třetině malé bílé oválné skvrny, které jsou u modrých černě olemovány. Trojúhelníku podobný konec pera je v základní barvě. Pruhy jsou protaženy přes křídla, nejsou ani široké, ani úzké. Jsou čistě bílé, jen u modrých s úzkým černým lemem. V čistotě pruhů a šupkatosti černých, červených a žlutých se musí dosud dělat ústupky. Bělohrotí mají 6 až 10 bílých letek. Tmavé hroty prodlužující štít neplatí za vadu.

Rázy

Bělohrotí, nebo barevnohrotí modří, černí, červení, žlutí s bílými pruhy, nebo šupkatí.

Vady

Slabé, nebo úzké tělo, plochá nebo úzká hrud', dlouhá záda, nedostatečně krytá záda, silně zvednutý ocas, opeřené nohy, silně nečistá, narezlá, nebo matná barva, bílá skvrna u kloaky, bílé punčošky, bílá za krkem u šupkatých, tmavý zobák u červených a žlutých, znatelně prokvetlé letky u barevnohrotých při zavřeném křídle (u červených a žlutých se toleruje), silně prokvetlý ocas, méně než 6 a více než 10 bílých letek, větší rozdíl než 2 letky u modrých, míchané letky, velmi krátké, zubaté, silně nečisté pruhy (rez a pepř), silně nečistá a nepravidelná šupkatost, nedostatečná hmotnost.

Kroužek č. 9.