



## 9. VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ (Vss)

SK: Velký světlý stříborný

D: Helle Großsilber

GB: Big Light Silver

Genotyp:

AA BB CC DD gg P<sub>3</sub> P<sub>3</sub>

Ing. Josef Zadina (2003)

**Měsíční přírůstky hmotnosti:**

Měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kg	0,5	1,3	2,2	2,8	3,4	3,8	4,1	4,5

**Bodovací stupnice:**

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Srst	15 bodů
5. Stříbřitost, pesíkování, stejnoměrnost	20 bodů
6. Barva podsady	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

**Pozice 1. – hmotnost**

4,00 – 4,24 kg	4,25 – 4,49 kg	4,50 – 5,50 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

**Pozice 2. – tvar**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3. – typ**

Tělo je zavalité, tvoří masivní válec se širokou hrudní i pánevní partií. Hlava je robustní, silná, široká a mírně klabonosá, u samic poněkud jemnější. Hrudní končetiny jsou silné se středně vysokým postojem. Uši jsou masité, lžičkovitě otevřené o délce 12 až 13 cm. Krk je silný, velmi krátký.

**Pozice 4. – srst**

Srst je hustá a pružná, s výraznými pesíky. Délka krycího chlupu je 3 cm.

**Pozice 5. – stříbřitost, pesíkování, stejnoměrnost**

Celkový dojem králíka je mléčný. Vzniká průsvitem podsadových chlupů k světlému krycímu chlupu a pesíkům. Nad tento krycí chlup přecházejí asi o 1 cm černé zesílené lesklé pesíky, které vytvářejí tzv. pesíkování. Světlá stříbřitost i pesíkování musejí být po celém těle stejnoměrně rozloženy, a to ideálně i na extemitách (tj. partie s kratším osrstěním jako jsou uši, oční kroužky, nosní partie, končetiny a pířko). Jejich poněkud tmavší zbarvení ne-

ní vadou. Jen na bříše je stříbřitost poněkud matnější. Barva očí je hnědá, barva drápů tmavě rohovitá.

**Pozice 6.** – barva podsady

Podsada je na celém těle sytě břidlicově modrá až ke kůži, bez ojedinělých bílých chloupků. Nesmí být téměř černá. S přibývajícím stářím se intenzita zbarvení podsady poněkud snižuje a při posuzování se na to bere zřetel.

**Pozice 7.** – péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

**Přípustné vady**

**Pozice 1. :**

Viz stupnice hmotnosti.

**Pozice 2. :**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3. :**

Méně zavalité, protáhlejší tělo (slabší zavalitost). Menší odchylky od stanoveného typu hlavy, méně zmasilé uši a menší odchylky od stanovené délky uší.

**Pozice 4. :**

Řidší, méně pružná, měkčí, mírně zplstěná nebo hrubší srst. Menší odchylky od stanovené délky srsti.

**Pozice 5.:**

Nestejněměrná, vločkovitá stříbřitost, nestejněměrné pesíkování. Tmavší extremity, zejména tzv. motýlek. Velmi slabé pesíkování, tvořící příliš světlý odstín (tzv. moučný pytel). Menší odchylky od předepsané barvy očí a drápů.

**Pozice 6. :**

Světlejší barva podsady, ojedinělé bílé chloupky v podsadě. V horní části poněkud tmavší podsada než v dolní části u kůže, tzv. zónovitě odsazená podsada.

**Pozice 7.:**

Viz Všeobecná část.

## Nepřípustné vady

### Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 4,00 kg a vyšší než 5,50 kg (neklasifikován).

### Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

### Pozice 3.:

Vysloveně dlouhé a úzké tělo (výluka). Dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši kratší než 11 cm a delší než 14 cm (výluka).

### Pozice 4.:

Srst téměř bez podsady (výluka). Velké odchylky od předepsané délky srsti (výluka).

### Pozice 5.:

Nadměrné pesíkování a vysloveně tmavá stříbřitost (výluka). Silně skvrnitá a nestejněměrná stříbřitost (výluka). Vysloveně černé extremity bez stříbřítosti (výluka). Chybějící pesíkování, způsobující téměř bílý celkový dojem (výluka). Výrazně tmavá hlava (výluka). Skupinky bílých chloupků (výluka), jiná barva očí a bílý dráp (vždy výluka).

### Pozice 6.:

Velmi světlá až bílá podsada (výluka), podsada silně promísená bílými chloupky (výluka).

### Pozice 7. :

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)